

Imunização: recomendações de rotina no pré-natal

VACINA	SITUAÇÃO	DOSES	ESQUEMA INDICADO	OBSERVAÇÕES
dT/dTpa	<ul style="list-style-type: none">•Esquema vacinal desconhecido•Não vacinada	Três doses	<ul style="list-style-type: none">• 1ª dose dT (qualquer idade gestacional)• 2ª dose dT (após 60 ou no mínimo 30 dias da primeira)• 3ª dose dTpa (após 60 dias ou no mínimo 30 dias da segunda, preferencialmente entre a 27ª e 36ª semana de gestação)	<ul style="list-style-type: none">• Caso iniciado o esquema tardiamente, para prevenção do tétano neonatal, a 2ª ou 3ª dose deve ser realizada pelo menos 20 dias antes do parto, respeitando o intervalo mínimo de 30 dias da 1ª dose, garantindo uma dose de dTpa• A dose de dTpa deve ser administrada em todas as gestações, independentemente de já ter sido realizada em gestações anteriores• Para gestantes em áreas de difícil acesso, administrar dTpa a partir da 20ª semana de gestação, adequando as doses conforme informações nesse quadro, visando não perder a oportunidade
	<ul style="list-style-type: none">• Esquema incompleto	Completar esquema	<ul style="list-style-type: none">• Conforme o número de doses faltantes, sendo uma de dTpa, preferencialmente entre a 27ª e 36ª semana de gestação	
	<ul style="list-style-type: none">• Esquema com três doses de dT	Uma dose dTpa	<ul style="list-style-type: none">• Administrar uma dose de dTpa preferencialmente entre a 27ª e 36ª semana de gestação	
	<ul style="list-style-type: none">• Vacinação completa	Uma dose dTpa	<ul style="list-style-type: none">• Reforço preferencialmente entre a 27ª e 36ª semana de gestação	
Hepatite B	<ul style="list-style-type: none">• Esquema vacinal desconhecido• Não vacinada• HBsAg (-) e Anti-HBs < 10	Três doses	<ul style="list-style-type: none">• 1ª dose (após a 14ª semana de gestação)• 2ª dose (após 30 dias da primeira)• 3ª dose (após seis meses da primeira)	—
	<ul style="list-style-type: none">• Esquema incompleto	Completar esquema	<ul style="list-style-type: none">• Conforme o número de doses faltantes	
Influenza	<ul style="list-style-type: none">• Em qualquer período gestacional	Dose única	<ul style="list-style-type: none">• Dose única	Caso não tenha tomado a vacina no período gestacional, recomenda-se tomar no puerpério