

GLOSSÁRIO

Amiloidose- doença de depósito na qual ocorre substituição de tecido funcional por tecido não funcional.

Anastomosada- quando vasos sanguíneos são ligados entre si

Anastomose- ligação de vasos sanguíneos mantendo o fluxo de sangue.

Anastomose veia ilíaca externa terminolateralmente- ligação da veia renal porção terminal na lateral da veia ilíaca.

Anestesia peridural- anestesia semelhante a raquianestesia mas não entra dentro do saco espinhal.

Anormalidade pieloureterais- anormalidades na pelve renal e ureter

Anticorpos heterólogos policlonais ou monoclonais antilinfocíticos- tipo de terapia utilizada para tratamento de rejeição instalada.

Anticorpos monoclonais- tipo de terapia utilizada para tratamento de rejeição instalada.

Antipirético- medicação utilizada para febre

Atracurio- tipo de anestésico.

Atrofia tubular- diminuição quase total das células funcionantes do túbulo renal.

Azatioprina – droga imunossupressora.

Azatioprina - droga imunossupressora

Bloqueio peridural- anestesia peridural.

Calcineurina- enzima (proteína) chave na ativação de linfócitos.

Cefazolina- tipo de antibiótico

Ciclosporina- droga imunossupressora

Cirurgia laparoscópica- cirurgia realizada por pontos específicos nos quais são

introduzidos pinças e outros materiais cirúrgicos e uma câmera.

Citomegalovírus- tipo de vírus que quando acomete indivíduos imunocompetentes pode se apresentar como quadro viral (febre, mialgia, mal-estar) mas em indivíduos transplantado pode ter apresentação clínica mais exuberante, inclusive até com piora da função renal.

Corticosteróides (pulsoterapia)- tipo de terapia com altas doses de corticóides utilizada para tratamento de rejeição instalada.

Criptococos agente causador de criptococose- doença infecciosa pulmonar e/ou cerebral.

Doenças linfoproliferativas- conjunto de doenças nas quais ocorre aumento desordenado de células de linhagem hematológica (células sanguíneas).

Dopamina- substância vasopressora utilizada em pacientes que necessitam aumento da pressão arterial, de uso hospitalar em geral em pacientes graves, na UTI ou centro cirúrgico.

Endovenoso- refere-se a uso em veias, medicações administradas em veias.

Estenose- estreitamento de vaso sanguíneo ou conduto.

Everolimos- droga imunossupressora

Fentanil- tipo de anestésico.

Fibrose intersticial- tecido cicatricial de substituição ao tecido normal.

Fístula urinária- saída de urina por outro orifício (geralmente pele) que não uretra.

Globulinas antilinfocíticas- tipo de terapia utilizada para tratamento de rejeição instalada.

Glomeruloesclerose focal-tipo de inflamação glomerular.

Glomerulonefrite membrano proliferativa tipo II- tipo de inflamação glomerular

Hematoma perirrenal- coleção de sangue ao lado do rim transplantado.

Heparina sódica- droga ou medicação que diminui a coagulação e evita a trombose (entupimento) dos vasos renais.

Hidrocortisona- tipo de corticóide

Hiperlipidemia- aumento de colesterol ou triglicérides

Hipernatremia- aumento do sódio na corrente sanguínea.

Hiperplasia gengival- aumento exagerado da gengiva

Hipovolêmico- diminuição da volemia, ou seja, do volume de sangue e plasma presente nos vasos sanguíneos, como por exemplo em casos de hemorragias.

Hirsutismo –aumento de pelos corporais

Histocompatibilidade HLA- conjunto de proteínas que compõem as células do

indivíduo e que conferem características próprias (diferentes) entre os indivíduos as quais podem proporcionar reação imunológica como no caso de transplantes onde um indivíduo entra em contato com proteínas estranhas às suas.

Imunossupressor- em geral droga utilizada para diminuir a resposta imunológica usada em transplantes para este fim e diminuir possibilidade de rejeição.

Incisão xifopubiana- tipo de corte cirúrgico realizado no abdome indo desde o início do abdome (quando termina o tórax) até a região corresponde a bexiga.

Infiltrado linfoplasmocitário perivascular- tipo de inflamação no vaso sanguíneo com predomínio de linfócitos.

Infusão- introdução de substância dentro de vaso sanguíneo. Por exemplo, infusão de soro fisiológico.

Intravenosa / endovenosa / endovenoso - refere-se a uso em veias, medicações administradas em veias

Linfedema- tipo de inchaço endurecido em membros (geralmente membros inferiores).

Listeria monocitogenes- agente causador de listeriose- doença infecciosa gastrointestinal.

Micofenolato - droga imunossupressora

Microbactéria- agente causador de infecção.

Midazolam- tipo de anestésico.

Mielotoxicidade- lesão causada por droga ou outro agente na medula óssea podendo levar a diminuição de células sanguíneas como glóbulos vermelhos (anemia)

Nefrectomia- retirada cirúrgica de rim.

Nefropatia por IGA- tipo de inflamação glomerular.

Noradrenalina- substância vasopressora utilizada em pacientes que necessitam aumento da pressão arterial, de uso hospitalar em geral em pacientes graves, na UTI ou centro cirúrgico.

Norcadia- agente causador de norcadiose- doença infecciosa que afeta pulmões e cérebro.

Normotensão- pressão arterial normal.

Obliteração do lúmen vascular- fechamento do vaso sanguíneo.

OKT3 -tipo de terapia utilizada para tratamento de rejeição instalada.

Oxalose primária- doença na qual ocorre deposição de oxalato de cálcio no tecido renal.

Paramediana retal externa j- tipo de incisão (corte) cirúrgico entre a região central e lateral do abdome.

Parênquima renal- tecido renal propriamente dito.

Perfusão *in loco* com soluções preservadoras- introdução em vasos de rim que foi retirado do doador de solução com substâncias com finalidade de preservar o órgão até o reimplante no receptor.

Prednisona- droga imunossupressora.

Prednisona- droga imunossupressora

Rapamicina - droga imunossupressora

Reanastomose- ligadura de vaso sanguíneo em outro vaso sanguíneo.

Reimplante ureterovesical- implante do ureter do doador na bexiga do receptor.

Rejeição hiperaguda- rejeição que ocorre nas primeiras horas após transplante.

Reperfundidos em banco – é um termo utilizado para procedimento que é feito com solução de reperfusão em mesa e banco na sala de cirurgia.

Sarcoma de Kaposi- câncer de vasos sanguíneos da pele, mais comum em imunodeprimidos.

Sirolimos- droga imunossupressora

Sistema pielocalicial- conjunto de contatos coletores de urina desde intra-renais (pelve renal).

Solução de perfusão Eurocolins III - solução na qual estão presentes substâncias que são infundidas com a finalidade de preservar o órgão até o reimplante no receptor.

Solução de ringer- tipo especial de solução.

Sulfametoxazol e trimetropin- antibióticos

Tacrolimos- droga imunossupressora

Toxicidade podocitária- lesão em podócitos um dos tipos celulares que compõem o glomérulo.

Tricotomia- corte de pelos para facilitar ou diminuir a contaminação durante cirurgia.

Trombose vascular- fechamento do vaso sanguíneo com prejuízo ao tecido.

Úlceras orais- lesão tipo aftosas em mucosa da boca e língua.

Vasculite necrotizante- inflamação vascular intensa que compromete a irrigação sanguínea do tecido.

Vasopressina- droga utilizada para tratamento de hipernatremia.

Vasopressoras- substâncias que aumentam a pressão arterial.

Virostático ganciclovir- medicação para citomegalovírus.

GOVERNO FEDERAL

Presidenta da República

Dilma Rousseff

Ministro da Saúde

Ademar Arthur Chioro dos Reis

Secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES)

Hêider Aurélio Pinto

Secretária de Atenção à Saúde (SAS)

Lumena Furtado

Diretor do Departamento de Gestão da Educação na Saúde (DEGES)

Alexandre Medeiros de Figueiredo

Secretário Executivo da UNA-SUS

Francisco Eduardo de Campos

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO

Reitor

Natalino Salgado Filho

Vice-Reitor

Antônio José Silva Oliveira

Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação

Fernando Carvalho Silva

CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE - UFMA

Diretora - Nair Portela Silva Coutinho

COORDENAÇÃO GERAL DA UNA-SUS/UFMA

Ana Emília Figueiredo de Oliveira

