

Variáveis incluídas no sistema de pontuação e sua relação com a pontuação atribuída para o diagnóstico da tuberculose em crianças

Quadro clínico-radiológico		Contato com adulto tuberculoso	Teste tuberculínico* e vacinação BCG	Estado nutricional
Febre ou sintomas como: tosse, adinamia, expectoração, emagrecimento, sudorese > 2 semanas. Adicionar 15 pts	Adenomegalia hilar ou padrão miliar • Condensação ou infiltrado (com ou sem escavação) inalterado > 2 semanas • Condensação ou infiltrado (com ou sem escavação) > 2 semanas evoluindo com piora ou sem melhora com antibióticos para germes comuns Adicionar 15 pts	Próximo, nos últimos 2 anos Adicionar 10 pts	Vacinados há mais de 2 anos • Menor de 5mm 0 pts • 5mm a 9mm Adicionar 5 pts • 10mm a 14mm Adicionar 10 pts • 15mm ou mais Adicionar 15 pts	Desnutrição grave ou peso abaixo do percentil 10 Sisvan** Adicionar 5pts
Assintomático ou com sintomas < 2 semanas 0 pts	Condensação ou infiltração de qualquer tipo < 2 semanas Adicionar 5 pts		Vacinados há menos de 2 anos • Menor de 10mm 0 pts • 10mm a 14mm Adicionar 5 pts • 15mm ou mais Adicionar 15pts	
Assintomático ou com sintomas < 2 semanas 0 pts	Radiografia normal Subtrair 5 pts	Ocasional ou negativo 0 pts	Não vacinados • Menor de 5mm 0 pts • 5mm a 9mm Adicionar 5 pts • 10mm ou mais Adicionar 15 pts	Peso igual ou acima do percentil 10 0 pts

Legenda: pts = pontos.
*Esta interpretação não se aplica a revacinados em BCG.
** SISVAN – Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (MS/ 1997).