



DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

SINAIS / SINTOMAS

	DENGUE	ZIKA	CHIKUNGUNYA
Febre <i>Duração</i>	>38°C <i>4 a 7 dias</i>	Sem febre ou subfebril ($\leq 38^{\circ}\text{C}$) <i>1 a 2 dias subfebril</i>	Febre alta >38°C <i>2 a 3 dias</i>
Rash Cutâneo <i>Frequência</i>	Surge a partir do 4º dia <i>30% a 50% dos casos</i>	Surge no 1º ou 2º dia <i>90% a 100% dos casos</i>	Surge do 2º ao 5º dia <i>50% dos casos</i>
Mialgia (frequência)	+++	++	+
Artralgia <i>Intensidade</i>	+	++	+++
Edema da articulação <i>Intensidade</i>	Raro	Frequente <i>Leve</i>	Frequente <i>Moderada / intensa</i>
Conjuntivite	Raro	50% a 90% dos casos	30% dos casos
Cefaléia	+++	++	+
Hipertrofia ganglionar	+	++	+++
Discrasia hemorrágica	++	Ausente	+
Risco de morte	+++	+*	++
Acometimento neurológico	+	+++	++
Leucopenia	+++	+++	+++
Linfopenia	Incomum	Incomum	Frequente
Trombocitopenia	+++	Ausente (raro)	++

Fonte: Brito C, Rev Soc Bras Med Trop 49(5):537-543, 2016

* Pode haver risco de morte nos casos neurológicos como a SGB decorrente de Zika ou para crianças com malformações congênicas graves.