

Fármacos usualmente contraindicados em idosos frágeis	Analgésicos e Anti-inflamatórios	AINE não seletivos (diclofenato, ibuprofen, meloxicam, piroxicam), fenilbutazona, indometacina, propoxifeno, meperidina
	Antidepressivos	Amitriptilina, clomipramina, imipramina e fluoxetina
	Antihipertensivos	Metildopam clonidina, nifedipina de curta ação, prazosin e reserpina
	Antiarrítmicos	Amiodarona, disopiramida, propafenona, quinidina, sotalol
	Antiespasmódicos	Diciclomina, hyoscyamina, propantelina, alcalóide beladona, escopolamina, hyoscina, homatropina e atropina
	Anti-histamínicos	Difenidramina, hidroxizina, ciproheptadina, prometazina, dexclorfeniramina, clorfeniramina
	Psicotrópicos	Antipsicóticos (clorpromazina, tioridazina)
		Antidepressivos (amitriptilina e fluoxetina)
		Benzodiazepínicos de curta e de longa ação (diazepam, clordiazepóxido, flurazepam)
Relaxantes musculares	Carisoprodol, ciclobenzaprina, orfenadrina	
	Barbitúricos (fenobarbital), biperideno, cimetidina, clorpropamida, codergocrina, dipridamol de curta ação, laxativos estimulantes e óleo mineral, nitrofurantoína, pentoxifilina, ticlopidina.	
Fármacos utilizados com monitoramento clínico ou laboratorial cuidadoso	Antipsicóticos (típicos e atípicos), antivertiginosos (metoclopramina, cinarizina, flunarizina), clozapina, digoxina, espironolactona (≥25mg/dia) ferro e warfarin.	