



## Classificação dos antidepressivos de acordo com o mecanismo de ação

<b>Antidepressivos tricíclicos</b>	Amitriptilina, clomipramina, nortriptilina e imipramina
<b>Ação no organismo</b>	Necessitam de cerca de três semanas para a verificação do efeito obtido com a dosagem utilizada.
<b>Doses terapêuticas</b>	As doses situam-se entre 75-150mg no contexto da APS.
<b>Indicações de uso</b>	Casos de dor crônica (amitriptilina e nortriptilina), transtornos ansiosos crônicos (clomipramina), tais como fobias e transtorno obsessivo-compulsivo.
<b>Contra-indicação</b>	Hiperprostatismo, distúrbios cardíacos de condução e glaucoma.
<b>Efeitos colaterais</b>	Boca seca, hipotensão postural, visão turva e sonolência. Em razão do seu perfil de efeitos colaterais, os tricíclicos vêm cedendo espaço para os inibidores seletivos de receptação de serotonina e os antidepressivos duais (inibidores da recaptção da serotonina e noradrenalina).
<b>ATENÇÃO!</b>	Tóxicos em altas doses, os tricíclicos devem ser evitados em pacientes com histórico/ risco de suicídio e em pacientes idosos em função do risco de hipotensão postural. Em pacientes obesos devem ser utilizados com cautela, em



CURSO DE CAPACITAÇÃO EM

# SAÚDE MENTAL

NA ATENÇÃO PRIMÁRIA

função do ganho de peso associado. Em pacientes com mais de 40 anos é recomendável que antes do de sua introdução seja realizado eletrocardiograma.

Fonte: Adaptado de: CHIAVERINI, D. H. et al. (Org.). **Guia prático de matriciamento em saúde mental**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, Centro de Estudo e Pesquisa em Saúde Coletiva, 2011. 236 p. Disponível em: <<https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/3231.pdf>>.