



## Classificação dos antidepressivos de acordo com o mecanismo de ação

<b>Inibidor seletivo da receptação de serotonina</b>	Fluoxetina
<b>Indicações de uso</b>	Eficaz tanto para o tratamento de transtornos depressivos quanto no tratamento dos transtornos de ansiedade, como o transtorno de pânico, o transtorno obsessivo compulsivo, a fobia social e a ansiedade generalizada. Na APS, a necessidade de mais de 60 mg ao dia indica a necessidade de avaliação por um especialista.
<b>Contra-indicação</b>	Pacientes com hipersensibilidade a estas drogas ou com problemas gastrointestinais como gastrite, refluxo gastro-esofágico.
<b>Efeitos colaterais</b>	Apresentam melhor perfil de efeitos colaterais. Dentre estes, destacam-se náuseas, vômitos e disfunção sexual, menos presentes no uso de tricíclicos.
<b>ATENÇÃO!</b>	Na maior parte dos municípios a fluoxetina é o único desta classe disponível no sistema único de saúde, sendo o que apresenta a meia-vida mais longa, com menor sintomas de retirada quando ocorre uma interrupção abrupta. Deve ser utilizado com cautela entre pacientes que utilizam



CURSO DE CAPACITAÇÃO EM

# SAÚDE MENTAL

NA ATENÇÃO PRIMÁRIA

múltiplas drogas por apresentar interações medicamentosas complexas.

Fonte: Adaptado de: CHIAVERINI, D. H. et al. (Org.). **Guia prático de matriciamento em saúde mental**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, Centro de Estudo e Pesquisa em Saúde Coletiva, 2011. 236 p. Disponível em: <<https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/3231.pdf>>.