



Classificação dos antidepressivos de acordo com o mecanismo de ação

Outros - Bupropiona	
Ação no organismo	Trata-se de um inibidor de receptação da noradrenalina e dopamina, praticamente sem nenhum efeito na receptação da serotonina.
Indicações de uso	Atua em sintomas depressivos como anedonia, lentificação psicomotora e do pensamento, na desatenção e na “fissura”, o que explica sua utilização nos casos de tabagismo e também como droga de segunda linha no déficit de atenção e hiperatividade. Muito utilizado pelas equipes de APS no tratamento do tabagismo.
Doses terapêuticas	A dosagem recomendada situa-se entre 150 e 450 mg ao dia, sendo o seu uso desaconselhado na gravidez e amamentação.
Efeitos colaterais	Apesar de provocar menos efeitos colaterais em relação ao funcionamento sexual, apresenta maior risco de induzir crises convulsivas.

Fonte: Adaptado de: CHIAVERINI, D. H. et al. (Org.). **Guia prático de matriciamento em saúde mental**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, Centro de Estudo e Pesquisa em Saúde Coletiva, 2011. 236 p. Disponível em: <<https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/3231.pdf>>.